



UAÇU 2020

SUPOORTE BÁSICO DE VIDA

Suporte básico de vida (SBV) é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos que objetivam o suporte de vida à vítima. O SBV é vital até a chegada do SIV (Suporte intermediário de vida - transporte até o hospital). O objetivo principal é não agravar lesões já existentes ou gerar novas lesões (iatrogenias).



Emergências Cardiológicas



Cadeias de sobrevivência de PCRIH e PCREH

Por : Enf. Mateus Gostart Alves

PCRIH



Vigilância e
Prevenção

Reconhecimento
e acionamento
do serviço médico
de emergência

RCP imediata
de alta qualidade

Rápida
destinação

Suporte avançado
de vida e cuidados
pós-PCR

Profissionais de saúde básica

Equipe de
ressuscitação

Lab. de
hemod.

UTI

PCREH



Reconhecimento
e acionamento
do serviço médico
de emergência

RCP imediata
de alta qualidade

Rápida
desfibrilação

Serviços médicos
básicos e avançados
de emergências

Suporte avançado
de vida e cuidados
pós-PCR

Socorristas leigos

SME

Depto. de
Emergência

Lab. de
hemod.

UTI

As situações de emergência mais importantes e que exigem socorro rápido são as crises hipertensivas, as pulmonares, as Arritmias Cardíacas, as doenças isquêmicas do coração, as doenças vasculares, como Infarto do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral, e a Parada Cardiorrespiratória.

Doença Isquêmica do Coração Angina e Infarto

São doenças isquêmicas do coração que se caracterizam por dor no meio do peito, que irradia para braços, pescoço e costas, por 10 a 15 minutos. É freqüente a pessoa ter esses sintomas e achar que não é nada, ou confundir com outros problemas de saúde.

A Angina e o Infarto podem ser desencadeados pela atividade física e, em geral, os sintomas melhoram com repouso. Também pode se sentir enjôo, falta de ar e fraqueza. Diante desses sinais, a pessoa deve deitar ou sentar, como ficar mais confortável.



Acidente Vascular Cerebral

Quando a pessoa tem um AVC, em geral, sente dor de cabeça, mal estar, tem paralisia facial, com isso, ao sorrir, fica com um lado do rosto torto, e perde a força, não conseguindo sustentar os dois braços na horizontal em frente ao corpo. Além disso, ao falar uma frase, enrola as palavras ou não consegue falar. Deve-se procurar o serviço médico rapidamente. Quanto mais cedo receber atendimento, maiores são as chances de reverter a situação.



Parada Cardiorrespiratória

A principal emergência cardíaca é a Parada Cardiorrespiratória, quando o coração para de bombear o sangue, podendo levar à morte súbita.

1. Fale com a pessoa e verifique se está bem.
2. Se não obtiver resposta, encarregue alguém de pedir ajuda.
3. Coloque a pessoa deitada com as costas no chão.
4. Eleve a cabeça para trás, desobstruindo as vias aéreas, o que facilita a respiração.
5. Verifique a respiração e, para tanto, tente ouvir ou sentir a pessoa respirando, ou ver o pulmão inflando.
6. Se não estiver respirando, faça respiração boca-a-boca. Tape o nariz da pessoa, sele a boca com a sua e sopre duas vezes, observando o pulmão inflar.



EMERGÊNCIAS TRAUMÁTICAS

Danos causados ao paciente por conta de traumas, ou seja, fatores externos. Os traumas são lesões provocadas no corpo exposto a energias que não são suportadas pela nossa fisiologia. Seguindo definições por dicionário, temos que o trauma vem de traumatismo.

Ferimentos e traumatismos

Os ferimentos (ou feridas) são lesões decorrentes de traumas (traumatismos), desde um pequeno corte ou escoriação até acidentes violentos com politraumatismo e complicações. O primeiro deles é que, independente do ferimento, o socorrista não deve tocar nele diretamente com os dedos para evitar infecções. Sendo assim, o ideal é cobrir o ferimento com compressa limpa e encaminhar, o mais rápido possível, o acidentado para o atendimento médico especializado.



As **queimaduras** são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Esta classificação é feita tendo-se em vista a profundidade do local atingido.

Tratamento imediato de emergência:

Interrompa o processo de queimadura.

Remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses.

Cubra as lesões com tecido limpo.



Emergência respiratória

A insuficiência respiratória é um distúrbio no qual o nível de oxigênio no sangue fica perigosamente baixo. Doenças que obstruem as vias aéreas, lesionam o tecido pulmonar, enfraquecem os músculos que controlam a respiração ou reduzem a força respiratória podem causar insuficiência pulmonar. Os indivíduos podem sentir falta de ar, apresentar coloração azulada na pele e se sentirem confusos ou sonolentos. A insuficiência respiratória aguda é uma emergência médica que pode resultar de Doença pulmonar prologada que piora subitamente, Doença pulmonar grave que se desenvolve subitamente em pessoas saudáveis em outros aspectos.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA



Pessoas com **insuficiência respiratória** aguda são atendidas em uma unidade de tratamento intensivo (UTI). Oxigênio suplementar é administrado para corrigir qualquer falta de oxigênio em pessoas com insuficiência respiratória. A ventilação mecânica corrige o problema de ventilação dos pulmões (e diminui os níveis de dióxido de carbono) em pessoas com insuficiência respiratória hipercárbica.



Referencia Bibliografica:

<http://sociedades.cardiol.br/> , pesquisado em 11/06/2020

<https://cursos.escolaeducacao.com.br/artigo/emergencias-traumaticas> , pesquisado em 11/06/2020

<https://www.msdmanuals.com/>, pesquisado em 11/06/2020



Telefone da instituição: (021) 3219-4040

Aluno: João Gabriel Nigre Zangerolame

E- MAIL: joaogabrielnigre04062002@gmail.com.

Prof: Nelson Nilton