



Vaidade

ATÉ QUE PONTO ELA VALE?

NOVOS TEMPOS NOVOS PROCEDIMENTOS



Quando nos deparamos com uma pessoa a primeira visão que temos é a de sua face, com ela conseguimos saber se a pessoa é mais jovem ou mais velha, e com isso a imagem se tornou uma prioridade.

A insatisfação com o próprio reflexo trouxe consigo a inovação, a criação de procedimentos, capazes de minimizar esses sinais trazidos pelo tempo!

Entre esses procedimentos os mais populares são toxina botulínica e a injeção de preenchimento cutâneo.

A toxina botulínica é conhecida como "botox" e é uma proteína produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*. Ela é aplicada em pequena quantidade com orientação de bloquear a ação do músculo no qual foi realizada a aplicação. Ela atua como um bloqueio da musculatura das linhas indesejadas. Sua recuperação é rápida e o procedimento apresenta mínima dor.

Entre as opções de preenchimento cutâneo o mais utilizado é o ácido hialurônico, ele mantém as fibras de colágeno que irão dar sustentação à pele, diminuindo os problemas de elasticidade, depositado na área mais superficial da pele, ele irá hidratar a região em que foi aplicado.



O conhecimento é o que faz um bom profissional

Para o uso desses procedimentos é preciso um estudo aprofundado da anatomia facial. Necessita de um conhecimento avançado da epiderme, derme e tecido subcutâneo, é preciso saber os limites dos segmentos faciais e dos ossos da face, da musculatura, vascularização, inervação sensitiva e motora.

A falta de conhecimento traz possíveis complicações, especialmente ruptura ou trauma local e isso é extremamente importante quando temos consciência de que a inervação motora da face ocorre pelos nervos faciais e seus ramos, sabendo que a ruptura pode acarretar sérios problemas muitas vezes irreversíveis inclusive a paralisia facial.

Alguns motivos pelos quais procedimentos estéticos como os preenchedores podem causar alterações/lesões na mímica da face são:

- técnicas de injeção que aumentam a dissecação do plano subepidérmico (por exemplo técnica em leque, injeção rápida, alta velocidade de fluxo, maiores volumes) têm sido associadas com maior número de eventos adversos devido à distensão dos tecidos e ao trauma ocasionando reações locais.
- Massagem após o procedimento pode ocasionar eritema.
- Protuberâncias são causadas por excesso de AH, injeção superficial de produto em áreas de pele fina.
- A injeção superficial do material de preenchimento pode levar ao branqueamento ou, no caso de ácido hialurônico, à coloração azulada no local da injeção.
- O risco de ativação do herpes simples após a injeção dérmica de preenchedores, se dá devido ao dano direto causado pela agulha aos axônios.
- As infecções cutâneas são normalmente relacionadas com a flora residente, introduzida pela injeção.
- A complicação mais temida entre aquelas relacionadas ao uso de preenchimento cutâneo é a necrose causada por oclusão ou trauma vascular.
- Nódulos podem ocorrer devido à má distribuição do material de preenchimento, à reação do produto (incluindo inflamação, hipersensibilidade ou reação granulomatosa) ou infecção.
- Reações de início tardio que levam semanas até anos: Nódulos, Nódulos inflamatórios, Granuloma, Infecção, Biofilmes, Migração de material de preenchimento.

As complicações causadas pelas substâncias podem resultar em cicatrizes definitivas, inclusive com deformidades permanentes, como nódulos e até mesmo a paralisia facial causada pela inflamação do nervo facial, afastando o paciente por tempo indeterminado de suas atividades habituais.

Não apenas afetando a parte estética do paciente, ainda afeta a saúde e traz serio problemas emocionais.



Toxina butolinica, paralisa os musculos, para reduzir as rugas. A aplicação feita no musculo errado pode alterar expressões faciais.

Preenchedores temporarios, o mais usado é o acido hialurônico, complicações são raras, a mais temida é a necrose, quando um vaso é atingido na aplicação.



Preenchedores definitivos, polimetilmetacrilato e silicone liquido entram nessa lista. POde ocorrer reação do corpo ao material e possivel migração do produto.

Os preenchedores estão entre os procedimentos injetáveis estéticos mais usados. Apesar de considerados muito seguros, pode acarretar sérios problemas se manuseados de forma incorreta. O profissional responsável por esses procedimento deve ter consciência do histórico do paciente, o conhecimento e técnica do profissional são fundamentais para alcançar um resultado positivo, e assim caso necessário também saiba lidar com possíveis reações.

REFERENCIAS

- JESUS, L. B., et. al. Caracterização Funcional da Mímica Facial na Paralisia Facial em Trauma de Face: Relato de Caso Clínico. Rev. CEFAC. vol. 14, n.5, São Paulo, 2012.
- PARADA M. B. et.al. Manejo de Complicações de Preenchedores Dérmicos. Surg. Cosmet. Dermatol. vol. 8, n. 4, 2016. Disponível em: <www.surgicalcosmetic.org.br/detalhe-artigo/517/Manejo-de-complicacoes-de-preenchedores-dermicos>. Acesso em: 02/03/2018.
- ANTONIO, C.R. Preenchimento na Região Glabellar – dissecando as razões da alta incidência de complicações e cegueira. Surg Cosmet Dermatol. vol. 4, n.2, São Paulo, 2004.
- TAMURA, B.M. Anatomia da Face Aplicada aos Preenchedores e à Toxina Botulínica – Parte I. Surg Cosmet Dermatol. vol. 2, n.3, São Paulo, 2010.
- Toxina Botulínica - BOTOX - AW Smile - Website title: AW Smile URL: <http://www.awsmile.com.br/tratamentos/toxina-botulinica-botox/>
- Andrade, Gisele de. Anatomofisiologia aplicada à estética. SER - SAGAH, 2017. [Bookshelf Online].
- Imagens ilustrativas- google.com
-

